庫全書

子部

證治準繩卷十九

鲜枝官太醫院思糧追表天錫

編修臣倉聖脈覆勘 校對官主簿臣總校官進士臣

曆録監生臣饒文 郭 朱 秨 P45. 概鈴 とこり見と時 霍亂吐利時氣思點瘴瘧亦白暴痢疾血月閉疼癖 發治準絕 (1) The second **瘙疰忤鬼氣卒心痛** 王肯堂 撰

多好四個台灣 四九老人小兒化服一九温酒化服亦得並空心服 服旋九如梧桐子大早朝取井華水温冷任意化 右為細末入研樂与用安息香膏并煉白產和劑 丁腫鷯癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病 香 白术 乖 内各一兩 薰陸香別研入安息香膏薰隆香別研 前梨勒 麝香研丁香 青木香 皮 白檀香 安息香为未無灰酒 烏犀角唇附子妙去朱砂 卷十九 華撥各二龍腦研蘇合香油 毎 服 沉

久之日事全書 易簡三生飲 鼻者難治 氣虚眩暈悉有神效但口開手散眼合遺尿聲如鼾 六脈沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及 遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或 邪神不敢近 之用蠟紙裹一九如彈子大緋絹袋當心帶之一切 南星雨川鳥去生附子雨十木香二錢 治卒中昏不知人事口眼喝斜半身不 经治华绳

孟グに 魚 壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方 亦有天雄代附子者並治卒中始作無不尅效 氣盛人止用南星和木香錢加生邁七片名星香散 以蘆管吹入鼻中候喷嚏其人少蘇然後進藥痰涎 服 右收阻每服半雨水二盏薑十片煎至六分去查 方氣虚人用生附子并木香如前數煎名附香 中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁濃 或口禁不省人事者用細辛皂角各少許為細 飲 温 末 凶

とこの日 なる 勝金九事治中風忽然昏倒若醉形體昏問四肢不收 可用 是風方用醒風湯小續命湯之類 磨沉香一呷許再煎! 方 理中湯薑附之類 風涎潮于上膈氣閉不通 生海荷水猪牙皂角一處浸取汁研成青 於帶 中暑不錄于此痰飲厥逆氣虛眩暈止守本 發治準絕 中濕則白术酒术附湯之類皆 沸服之候服前藥已定審的 中寒則用附子

多牙口屋 法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾 緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無 龍眼大以朱砂為衣温酒化下一丸甚者二丸以吐 有 法引金虎碧霞為戒且如辛暴涎生聲如引鋸牙 為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐 右將朱砂末二分與二味末研与用膏子搜和丸如 石電 梨蘆 和珠砂州雨 粉無 吐 쎎

St. 10 unt Archite 治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥 附還魂湯千治卒感忤思擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺 病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾 或已死絞口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分 如芡實大每服一丸用綿裹放患人口中近喉處良 右將二味在于新瓦上蝦令江子焦赤為度煉塞丸 久吐痰立愈門口禁條 江子上粒去白磐如拇指大 经治草冠

多牙四月白重 續命湯年通治八風五痒痿厥等疾以一歲為總六 越此 立蘇 樂又於六經別樂內隨證細分加減自古名醫不能 經為別春夏加石膏知母黄苓秋冬加官桂附子 右吹咀水八升煮取三升分三服力無 中風 麻黄馬桂心雨甘草雨杏仁粒十 桂方 心云 只張 芍 味景

とこりらいま 澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎 煩多聽者加犀角屑平 附雲岐子加減法 子倍芍藥 水一盏半生逼五片煎至一盏去滓稍熟服食前 右除附子杏仁外為粗末後入二味和白每服五錢 麻黄去人多盖黄芩属芍藥 一大炒防己 骨間冷痛倍用桂枝附子 官桂各一防風 如精神恍忽加茯苓遠志 橙治华缒 骨節間煩痛有熱者去附 半附子炮去 甘草炙川芎 臟寒下痢者 燥悶小 · 雨皮 便

多好四個分章 疎 膝石斛各一 黄 風湯浩治表中風邪半身不遂麻木語言微澀季春 有當歸 者用麻黄三人參桂枝白木和二無附子防風生薑 初夏宜服 去防已黄芩倍附子白术 各半 婀 珦 夏加黄芩も 兩 失音加杏仁 自汗者去麻黄杏仁加白术 身疼痛加秦艽 卷十九 秋加當歸 啊 -可用 一两 如或歌笑語無所不及 附執 峢 痢 两四 腰 不 冬加 烠 胁 力口 春加 附子 弱 桃 仁 DO 杜 麻 兩半

炎之四事全書 麻仁丸不通 化湯 每服三兩水三升煎至一升半終日服以微利則 避熱水弱爐候大汗出去葫蘆冬月忌服 右攻咀每服五錢水一小碗煎至六分去查温服 厚 各半 麻黄三两杏仁炒去 益智仁各一 朴製大黄 潔 古 积實 验治华純 羌活各等 炙甘草 六 脚 麻 止

羌活愈風湯水療肝肾虚筋骨弱語言難精神昏情是 大秦艽湯 兩 服無時如遇天陰加生薑七片煎如心下痞每服 右十六味吹咀每服一雨水二盞煎至一盞去浑温 加积實一 苓 羌活 秦艽 生地黄 石膏兩二 獨 一錢煎此是秋冬藥如春夏加知母 活 熟地黄 防 風 甘草 黄芩 兩各 川芎 細辛 白术 當歸 响半 白芷 苔藥 茯 兩

藥能安心養神調陰陽無偏勝 道皆精不足也故心亂則百病生心静則萬病息此 枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜以多思思忘之 中風濕熱內弱者是為風熱體重也或瘦一臂肢偏 川芎 人參 羌活 當歸 獨活 知母 甘草多防風 杜仲炒秦艽 細辛 甘药花 枳設 防己 白芷 柴胡 黄芪 麻黄县地骨皮 海荷葉 半夏 蔓荆子 枸 前 祀 胡

火之口車全書 一

橙治草醚

重災日 清 假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黄一兩勻作 再煎查服俱要食遠空心嚥下二丹九為之重劑 至 右三十三味重七十五兩吹咀每服 肺 瞧 厚 鍾温服 蒼木 下四白九為之輕劑立其法是動以安神靜 朴盤熟地黄 石膏 天陰加生薑三片煎空心一服 兩一白茯苓 芍藥品四官桂 黄芩品三 雨水三鍾煎 生地 鮨 黄 鮕 臣卜

人是日年人島 膏黄苓知母各二兩謂迎而奪陽明之氣也 廋 而奪少陽之氣也 此藥常服之不可失於四時之輔 則住 後本方中加半夏人參柴胡各二兩木通四兩 謂迎 亦勻作四服每服加生薑五七片臨即煎服得利為 四服每服加生薑五七片空心服以粥投之得微 如一旬之通利用愈風湯三兩加大黄一 證治草冠 如望夏穀雨之後本方中加石 如望春大寒之 両

多りにん 之濕也 地之所宜邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使 此 陰之氣也 香桂各一兩謂迎而奪大陰之氣也 夏之月本方中加防己白术茯苓各二兩謂勝脾土 五藏偏勝及不動於榮衛如風秘服之則永不燥結 之後本方中加附子官桂各一兩當歸二兩謂勝 雖立此四時加減更宜臨病之際審證之虚實土 /11 重 如 女ロ 初秋大暑之後本方中加厚朴二雨藿 得春氣候減冬所加藥四時加減 卷十九 如皇冬霜 降 類 火

く・こつう 四 白丹沒清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不清利也 兼能下强骨髓 皆可服之如解利四時傷寒隨四時加減 若已病者更宜常服無問男女小兒風廂急慢驚風 中天麻九各一料相為表裏乃治未病之聖藥也 久瀉服之能自調適初覺風氣能便服此藥及新方 甘草 白术 ٠. ماران الماران 砂仁 人参西半白正 一羌活 白茯苓 经治準絕 香附 獨活 防 風 服 海荷 川芎

越定四年全書 丹九儿 養血也宜和是行禁衛肚筋骨也非大藥不能治 濁養 嚼之煎愈風湯送下 右為末審丸每兩作十丸臨即服一丸分五七次細 者於 日麝香为 九 霍香 柴神 風能動而多變因熟勝則動宜以静勝躁是 助健天真 華濁 腠中 白檀香卷十知母 理之 研龍腦另十黃 清前 中方 濁清 者肺 坠此 半另 强方 骨安 超研 髓神 各 組 辛 **濁清** 中中 發 甜竹葉 之清 清者 者歸 柴肺

久己日事全 肚筋骨杜仲使筋骨相著羌活防風治風要樂當歸 壅塞微以七宣九疎之使藥再為用也牛膝革解强 百九空心食前温酒或白湯下平明服藥日高飢 食不飢且止大忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺 右為末煉塞九桐子大每服五七十九病大者加 描活雨 大杜仲七 雨炒當歸 絲 超治华紀 全用羌活+ 焙 五兩生地黄 至 則

瀉青丸 重少日 自 使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小 不可以藥利之既自汗津液外泄小便内少若利 寒不能安卧此是風熟煩燥瀉青九主之如小 後另有此病加添藥如中風自汗昏冒發熱不惡風 風癇病不能愈者吐論厚朴九出潔古家珍其本方 地黄養血和榮衞玄參主用附子佐之行經也 行也兼此證屬陽明經大思利小便須識之 7:1 True 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧 便 便

久己日奉仁島 一 至實丹和治卒中急風不語中惡氣絕中諸物毒暗風 暈口鼻血出惡血攻心煩燥氣喘吐逆難產問亂 頣 胎不下已上諸疾並用童子小便一合生薑自然 中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蟲毒水毒産後血 心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍 三五滴入小便内温過化下三九至五九神效又療 目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語 煩燥之故也見頭 提治华超 <u>+</u> 惚 汁 廴

再ラリ 急騰心熱卒中客件不得眠睡煩燥風涎搐搦每三 桐子大用人参荡化下三九至五九又療小兒諸 湯煮烊入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸 右將生犀玳瑁為細末入餘藥研与將安息香膏重 玳 為藥 人參 人と言言 本銀箔 瑁屑 琥珀 去沙土大約得淨数一一兩半為末以無灰酒 天竺黄 十十各五 一兩麝香研龍腦研 卷十九 牛黄研天南星水為軟 生鳥犀屑研朱砂砾雄黄研 兩火熬成 各二金箔 濾 膏 半 兩切安 息 痼 生 女口

活命金丹鑑治中風不語半身不遂肢節頑麻痰涎上 えこりを たず 潮 幼皆可服 毒藥發熱腹脹大小便不利貿膈痞滿上實下虛氣 **歲兒服二丸人參湯化下** 閉面亦汗後餘熱不退勞病諸樂不治無問男女老 黄 貫衆 咽嗌不利飲食不下牙髮緊急口噤及解一 편 牛黄研珠子粉 甘草 1 板藍根 经治华起 生犀角 乾葛 甜码 海荷各五 切 辰 酒

動定四月百書 射干湯 下已上並量大小加減服之 器收貯多年不壞如療風毒茶清化下解毒藥新汲 朱砂為衣就濕用真金箔四十片為衣臘月修合瓷 右為末與研藥和勻蜜水浸蒸餅為劑每兩作十九 女子目下青黄色可治急炙肝腧百肚更宜行經順 水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化 末為衣麝香研桂四錢研麝香研桂 治肝經受病多汗惡風善悲監乾善怒時憎 青黛各三龍腦研

とこつらいか 犀角散 澀上焦風熱口眼唱斜脚膝痛無力 温 右為攻咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓不拘時 氣若目下大段青黑一黄一白者不可治 膏各半 射干 犀角屑 服 兩 治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛言語謇 白芍藥兩一意次仁而桂心 石膏 避治华起 羌活蘆属年角屑各七 牡蠣 錢半 1

動定四月在書 治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠即 右五味相調和今白每温服一合宜頻頻飲之 右攻咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓 温服無時 益甘菊花 行澀 兩甘草美二 天麻 荆 积散 炒當歸盖酸東仁 瀝 獨活盖黃書盖艺術 葛根汁合三生薑汁 卷十九 白术 防風蓋白芷 白盛合 黄芩

收定四車全書 题 牛黄散 遠志湯 右為細末每服二錢煎小麥湯下不拘時日進二服 時戰 陳動者不可治 色正赤猶可治急炎心牏百肚或青黃不定面色時 但得偃卧不可轉側問亂冒絕汗出風中於心也唇 麻黄粮各赤芍藥 白木兩 遠志去心二人參差石菖蒲 治心藏中風恍惚恐懼問亂不得睡卧語言 治心經受病多汗惡風善怒赤色口不能言 验治學絕 羌活蓝細辛出去

麻黄散 金シリ 時 錯 右為細末研令勻每服二錢煎麥門冬湯調下不拘 爁 麻 風 豸し 牛黄母麝香母犀角屑 ヵ 1:11 治心藏中風虚寒顫心驚掣悸語聲混濁口 幾朱砂米鐵粉研麥門冬去心各 川升麻 甘草灸白鮮皮 獨活 卷十九 遠志去一些黄五錢半 人参蓝沙参 茯神去 羚羊角屑 龍 齿 研另 龍 防

以走四車全書 -茯神散 入荆恶半合更煎一二沸温服無時 右㕮咀每服五錢水一中盞薑五片煎至五分去滓 喎冒昧好笑 茯神太羌活 本羌活去蘆各 麻黄品白术 南當歸去人多盖遠志出川升麻 治心臟中風精神不安語澀昏問四肢沉重 麻黄去龍齒另研各赤芍藥 防風 發治車起 芎藭 甘草灸漢防己 桂心 立 갽 甘

犀角丸 滓温 煩熱或時舌强語澀寫悸不安 右㕮咀每服四錢水一盞半生薑四片煎至一盞去 犀角屑 風 蘆沙参盖茯神七川升麻 服不拘時 治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭面心胸 遠志去犀角屑為七 西蔓荆子 羚羊角屑 薏苡仁 老子 天麻 麥門冬出人參蓝 防 天門冬士歲姓 風崖遠志去 羌 防

J. 17 i. 石斛 損 大每服五十九簿荷湯下不拘時 右為細末入研令与煉蜜和捣五七百下九如梧子 判皮 酒 石斛四黃者盖人參盖防風和半丹砂飛杜仲 砂水 金箔研銀箔研各五 玄寒各七年黄仍麝香另研各龍齒另鐵粉研 牛膝 J. Lin 治心臟中風下注腰脚除頭面遊風兼補虚 登台軍軍 <u>+</u> 硃 簏 去

欽定匹库全書 白术湯 不能飲食口色黄者可治其狀但踞而腹滿通身黄 色口吐鹹水風中於脾也急灸脾腧百壯目下及手 力頻要相續不可斷絕 右㕮咀酒五斗同浸一宿每服二三合加至一升 各半 細辛去尚天門冬去生薑 各三意次仁 五味子 升 治脾經受病多汗惡風身體怠懂四肢不 白茯苓去山藥 山茱萸 单解 枸杞子 兩 動 酒

てこうえ 防風散 志意恍惚身體沉重 温服無時 足青色者不可治 右㕮咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盏半去滓 防風盗麻黄品人參 皮 白木盖厚朴整防風雨 五加皮多半 治脾藏中風手足緩弱舌强語澀胷膈煩 经治华绳 附子处去橘皮白白 附子皮臍桂心 き 旭

多定四年生書 上 聖散 右為改咀每服四錢水一中盛邁五片煎至六分去 右為細末每服二錢温水調下不拘時忌食生冷油 滓温服不拘時 皮出屬羊角屑為七甘草品 黃着其赤茯苓去酸聚仁 积裁去数天麻各 弓弱雨 意以仁半 治脾藏中風心腹煩燥頭面微腫冷汗頻出 卷十九 川大黄 鏠 炙半 白术 迆 骨皮 獨 活 **盖杂白** 白蒺藜

久己日草之書 一 五味子湯 腻猪雞 床如此数日必死矣 肺已傷化而為血不可治也若妄极空指地指衣模 下至於口上至於眉色白急炙肺腧百壯若色黄其 甚其狀偃卧胸滿息促冒問風中於肺也其鼻兩邊 赤芍藥 五味子 治肺經受病多汗惡風時咳短氣畫蹇夜 杏仁皮尖桂心兩時風 川芎兩一川椒二錢 證治準絕 炙甘草

单解散 多月四月 石門 腳百餘北齒黃髮鬚直面如土色者不可治 脇下左右上下有赤黄色如如餅餅者可治急痰腎 不能行立肌膚變色但坐而腰痛此風中腎經也 拘時 右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞半去浑温 華解沒狗看 治腎經受病則多汗惡風而癰浮腫脊骨 杜仲出炒白茯苓士及各何首鳥 服 视 掮 不

沙定四車全書 一周 獨活散 右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至一盞去 緩弱不隨頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重 右為細末每服二錢米飲調下無時 丹參產牛膝通草解通甘草多細辛去菖蒲 两 积 殼 基 數 川 芎 獨活產附子皮將當歸產防風 各半 啊 治腎藏中風腰脊疼痛不得免仰兩脚冷痺 ,姓活华起 甘菊花 山茱萸核黄蓍 天麻 九 桂心 白 各

風中腑兼中臟治驗 患半身不遂語言審澀心神昏情煩燥自汗表虚惡 怖 風 浑温服無時 飲食減少不敢用不然則又滿問晝夜不得瞋目 中三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥疼痛不利 寐最苦於此約有三月餘凡三易醫病全不減至庚 小便頻多大便結爆欲用大黄之類下之則平日 女口 洒水雪口不知味鼻不聞香具耳聞 卷十九 張安撫年六十一歲已未冬月 픕 則 觽 而

久己日日上日 治其本也宜以加減沖和湯主之 睡多中脫氣痞似噎子因思經云風寒傷形憂恐忽 病則宜實表裏養衛氣寫肝木潤燥益元氣慎怒是 則為疾矣又云形樂志苦病生於脈神先病也邪 地之疾風名之此風氣下陷入陰中不能生發上行 怒傷氣氣傷臟乃病臟病形乃應又云人之氣以天 其本邪氣乃復論時月則宜升陽補脾胃瀉風木論 加之邪入於經動無常處前證互相出現治病必求 经治草绳 7 風

多好世紀 四十四 黄耆五分五味子二十粒畫夜不得睡乃因心事 右咬咀作一服水二盏煎至一盏去查温服自汗加 授心火内動上乘陽分衞氣不得交人陰分故使然 曰不然衞氣者畫則行陽二十五度夜則行陰二十 曰不得睡三月有餘今困睡不已莫非它病生乎予 也以殊砂安神九服之由是畫亦得睡十日後安撫 柴胡 黃檗鴻黃本 陳皮 人參 苔藥分二 黄着分五升麻 當歸 甘草多各半夏 煩

欠己日奉亡時 右作一 湯洗之 燥熱胸膈痞元小便多服藥後小便減少大便一 晡 少陽之氣飲三服至十五日全得安卧減自汗惡寒 病之有馬止有眼白睛紅隱澀難開宜以當歸連翘 五度此衛氣交入陰分徇其天度故安撫得睡也何 黄連 微有問亂不安于前沖和湯又加柴胡三分以升 一服水二盛煎一盏時時熱洗十三日後至日 黄檗各五連翹分當歸 Ų 強治準紀 甘草谷三 主

金河四层 牢牙散治之 時時咽之前證良愈止有牙齒無力不能嚼物宜以 右吹咀總作一服水二盏煎至七分去滓稍熟噙激 13 語言快利午後微澀宜以玄參升麻湯治之 按之微有力止有 粘子 升麻 行鼻閉看臭口知味飲食如常服微弦而柔和 白雪 玄參 黄連分五黄本分四連翹 甘草 中妨問會厭後腫舌赤早晨 殭蠶分 防風 桔梗谷三 鼠

久足口車全書 風 為陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之 節而刺之使經絡通和血氣乃復又云陷下者炙之 柘余思針經云虚與實隣決而通之又云留瘦不移 肌肉瘦不能正卧卧則痛甚經云汗出怛阻使人偏 安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出 右為細末入麝香研勻臨卧操牙後以温水激之 錢白茯苓 羊脛骨灰 人多分 梧桐淚 升麻錢一生地黄 隆治 华超 黄連 Ī 石膏

金ラビ 清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣 臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以 出少肩臂微有力至五月初八日再炙左肩井次于 針後炙二七壯及至炙瘡發於枯瘦處漸添肌內 尺澤穴各炙二十八肚引氣下行與正氣相接次日 火引而上補之溫之已上證皆宜炙剌為此先剌 二經之井穴於四月十二日右肩臂上肩井穴內先 白芍藥分人參 升麻 柴胡 各 四 天門冬 汗

次定四車全書 | !! 麻子仁另研大黄酒娱各當歸尾 滯 多加黄蓍五分後以潤腸九治其胸膈痞滿大便澀 右攻咀作一服水二盏煎至一盏去滓温服食後汗 題 木香 麥門冬分一陳皮半一甘草矣二分黄芩 桃仁泥 檳 升麻各半人多 榔錢各二 推治华起 生甘草 枳實此白芍藥 Ť 陳皮 黄檗

猶未退宜微收實皮毛益胃氣秋以胃氣為本以益 大每服七八十九温水食前服初六日得處暑節 氣 除桃仁麻仁外為末却入二仁泥蜜和九如 調荣湯主之樂中加時樂使邪氣不能傷也 人参益氣和中陳皮二分為在熟地 白芍 氣上升兹荣百脈當 品和血潤燥黃耆二分為使使陽明當婦二分為佐黃 收治肝水四分胃佐 半夏 處強胃進食甘草 月調和胃氣三分佐療風甘草二分矣為佐 之邪 白木和中厚肠胃 進 血潤燥鴻 君五 桐

とこの巨白馬 小便不利三国白散子 四 物湯見鼻 嘔吐痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒六脈沉伏及霍 亂吐瀉小便淋瀝不通 熟之物反助暑邪秋氣不能收止氣得復而安矣 右㕮咀作一服水二盏煎至一盏去浑温服忌食幸 安循 氣 柴胡出于胃中乃 行于天上麥門冬三分中益柴胡二分為使引少陽之氣使來門冬三分 肺有 氣暑 秋分節不用氣未退故加之 發治草範 治肾肝中風涎潮壅塞不語 玉

多方四四白雪 星香湯為治中風痰盛服熟藥不得者 霍香正氣散 痰涎壅盛二陳湯見疾 每服四錢水一盛薑十片煎七分不拘時温服 心冷服霍亂加藿香小便不利加木通燈心が根煎 右為末每服二錢水二盞薑七片蜜半匙煎七分空 南星处木香色 大附子去皮滑石各半雨製半夏七錢 ř 治傷寒頭疼怕寒壯熱或感濕氣霍亂

欠足四車全書 一 養正丹見 青州白九子都治男婦手足癱疾風痰壅盛嘔吐涎沫 四君子湯見虚 右攻咀每服三錢薑三片聚一枚煎熟服 扁豆黄連名霍常湯 大腹皮 朴 陳皮士白木 白芷 整治學與 茯苓 蘇藍葉 藿香為三 苦梗 半夏雨二炙甘草 Ī 厚 啊

吐瀉常服除山嵐瘴氣伏暑吐瀉脚轉筋

加香薷

菜豆大薑湯下二十九無時 以手揉出如有浑更研再入絹袋擺盡為度置磁益 日早再换新水攪如此法春五日夏三日秋十日冬 右為末以生絹袋盛於井花水内擺出如未出者更 及小兒鶴風婦人血風 十日去水晒乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清 中日晒夜露至晓撒去舊水別用井水攪又晒至來 半夏生七两南星生三白附子生二 如癱瘓風温酒下小

AL TO TO AT ATT THE 碧霞丹 立驗 **史吐出痰涎然後隨證治之如牙鯛緊急幹開灌之** 服急用海荷汁化下一九更入酒半合温缓服之 右三味為末入石綠令勻麪糊為九如雞頭實大每 兒鵜風薄荷湯下三五丸 牙鯛緊急目睛上視及五種癎病涎潮搐搦 石綠州九度附子尖 治卒中急風眩暈僵什痰涎壅塞心神迷問 避治华超 鳥頭尖 蝎稍各七 芝 揰

風 凡中風口噤不能開用白鹽梅指齒即能開 口味稀涎散 郵定匹库全書 眼喎科清陽湯車治口喎斜頰顋緊急胃中火盛汗 不出而小便數 中之痰逆上者即吐隔問者即下 分吹入諸病皆愈痰涎壅盛者以五分燈心湯下喉 右先將攀化開却入二味攪与待攀枯為末每用三 江子仁六粒每粒牙皂切片明蓉 治中風不語牙關緊急單城雙城 兩

欠己日声心島 秦光升麻湯雖治中風手足陽明經口眼鳴斜四肢 急惡風寒 内泄衝脈之火熾 血絡中大寒此藥少代燔針切刺破惡血以去凝結 服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喎筋急者是筋脈 攻咀作一 黄蓍 紅花 服酒三盏煎至一盏三分去滓稍熟食前 黄檗酒桂枝卷 當歸身 验治华艇 升麻後一葛根半 炙甘草 蘇木 生甘草分五 芝 枸

我好四個白雪 半身不遂順風勻氣散方治中風中氣半身不遂口眼 唱斜先宜服此 稍熟服食後服藥畢避風寒即得微汗出則止 每服一雨水二盏連鬚慈根白三莖煎至一盏去滓 白木與人參 白芷 青皮 葛根 防風 甘草多名烏藥 桂枝各三 甘草成芍藥 人參兩 秦艽 天麻終一沉香 炙各 白芷 紫蘇

えいつ きたか 虎骨散獨治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用麻黄發 為細末每服二錢食後温酒調下骨中煩疼加生 併煎風氣腰痛亦宜服之 分作二贴每贴水二盏生薑三片煎八分温服二滓 汗枯津液惟此方潤筋去風 當歸二赤芍藥 兩鳥蛇肉母 內藏寒自利加天雄 續斷 隆治準絕 兩半 白术 藁本 虎骨 兲 地

動食四個白重 治半身不遂口眼喎斜頭目眩暈痰火熾盛筋骨時疼 黄耆酒 **虎脛骨酒汽油中風偏枯不隨一** 語蹇澀手足不遂時覺不仁見若牌 右到如豆囊藥以酒一斗漬十日每熟服一盏無時 石斛根石楠葉 葉 巴戟士心各 杜仲 治風濕痺身體帰麻皮膚瘙痒筋脈拘孽言 -炒川牛膝 防風 考欝 虎脛骨或當歸 切諸風擊拳 狗脊粒 川續 茵芋 斷

Dunk Links 固根本外散病邪王道劑也多服見效 之能不致於燥又清熱運動疎風閉經絡通腠理内 此方有補血活血之功不致於滯有健脾燥濕消痰 經絡肌表筋骨之間尚未入藏府並以此方治之益 火或惱怒而逆肝氣遂有此半身不遂之證其在於 有其病根後因感冒風寒或過嗜醇酒膏梁而助痰 此乃原於血虚血熱挾痰挾火經絡肌表之間先已 白木 川芎幾半南星 半夏 芍藥 茯苓 怪治準绳 £

多分四人一個 失暗不語地黄飲子明治舌痛不能言足廢不能用腎 虚弱其氣厥不至舌下 水煎入竹涯薑汁侵晨服 分紅花 附子地五味子 熟地黄 天麻錢各 酸聚仁 黄芩 牛膝 巴戟去山茱萸去內從落墙 石斛 甘草及各黄檗》 卷十九 白茯苓 川當歸 橘红分 羌活 菖蒲 生地黄 遠志以官桂 防 熟地黄 風 桂 六各

久足四車全書 涼隔散見發 滌痰湯 右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服 盏半煎八分服無時 右為末每服三錢生薑五片棗一枚薄荷七葉水 南星製半夏治洗七次枳實处茯苓去及各橘红 發石菖蒲 人參錢 竹茹分甘草錢 執 麥門冬去心各 治中風痰迷心竅舌强不能言 -验治準絕

解語湯 加 味轉舌膏 荷湯嚼下一九 右為末審煉九彈子大硃砂五錢為衣食後臨卧簿 炒防風 羌活 連翹 黄各五犀角 1:1:1 当一 蒲方 遠志 防風 桔梗 遠有 去石 海荷 川芎卷三 天麻 卷十九 黄芩炒玄明粉 肉桂 柿霜雨 川芎 石菖蒲錢梔子 甘草 南星 酒大 陳

炎足四事全書 訶子湯見 茯神散雖治證同前 正舌散鑑治中風舌强語澀 右為末每服二錢豆冰酒調下 水煎入竹瀝半盞再一二沸服 羊角分等 雄黄 刑 於穗谷等 戍 酸聚仁 白芷 強治準絕 當歸 人參 甘草 羚

清心散 治中風不語 右為末每服一二錢溫酒調下 調稀搽舌本上 取龜尿法置龜於新荷葉上以 右為末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水 茯神心啊一 青黛 硼砂 取龜尿少許點於舌神效 海行将 喝稍去毒 薄荷養二十黃 水片分三

V. 10 not Linker W 身痛鐵彈九部治卒暴中風神志昏情牙關緊急目睛 再研与滴水和丸如彈子大每服一丸食後臨卧 直視手足與癡口面喎斜涎潮語澀筋孽骨痛癱瘓 右先將乳香沒樂於陰涼處細研次入麝次入樂末 偏枯或麻木不仁或瘙痒無常應是風疾及打撲傷 損肢節疼痛皆治之通經絡活血脈 乳香研沒樂了兩川鳥頭蛇去皮臍為 乾四兩為末麝香細研浸淘去砂石麝香細研 澄治準經 五霊脂 簿

多定四母全意 蠲瘅湯 味到散為治中風血弱情痛連及筋骨舉動艱難 每服四錢水一盞薑八片棗三枚煎食後臨卧服 荷酒磨化服 至聖保命金丹鑑治中風口眼唱斜手足雜曳語 風 附子地 當歸洗黃蓍及白芍藥而川芎 白术雨半肉桂雨茯苓 熟地黄卷七 治風濕相搏身體煩疼手足冷痺四肢沉重 防

人工可具 上 牛黃清心丸都治諸風緩縱不隨語言審澀心怔健忌 用薄荷湯化下無時此藥鎮墜痰涎大有神效 用一丸細嚼茶清送下新汲水亦 右十二味為末研藥 言譽澀四肢不舉精神昏情疾多 半麝香领一 貫泉 自生地黄後大黄 申青黛 砂砾牛黄硫滴黄 薄荷各二珠子研龍腦 隆治準題 審九芡實大金箔為衣每 板藍根卷三朱 如病人嚼不得 研 錢各

多方四 恍惚去來頭目眩冒胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏愦 少睡喜怒無時或發狂癲神情昏亂 又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂惨感虚煩 白芍樂 麥門冬山黄芩 當歸出防風出白木 勝時七銭半白飲 角扇香研龍腦研各肉桂去 人豆黄卷碎阿 兩半白茯苓皮柴胡各一白茯苓去 月白雪 各一兩二後半神勉所清黃少人參二兩半羚羊仁处炒黃别研神勉研清黃少人參去蘆各 乾薑錢半 桔梗 芎藭 杏仁去皮 炮各上 牛黄研一兩 犀

久己日事亡者 图 三一承氣湯明治傷寒大水氣湯證腹滿實痛調胃承 防風通聖散見眩 即酌度多少以竹葉湯温下 為細末入餘藥和勻用煉蜜與棗膏為九每兩作十 九金箔為衣每服一九温水化下食後服小兒驚癎 右除棗杏仁金箔二角屑及牛黄雄黄膃麝四味外 片為衣 大東 及核研成膏片內四百大東一百枚蒸熟去 用屑的雄黄外幾乾山藥的甘草到炒金箔 经治华起

防風九都治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急 年少に 目眩旋暈心怔煩問手足無力骨節疼痒言語蹇澀 服 水一鐘半生薑三片煎至七分內硝煎二沸去滓温 此下劑也 湯合而為一也及治中風僵什風痼發作並皆服之 氣湯證膽語下利小承氣湯證内熟不便三一承氣 不拘時以利為度 大黄錦紅芒硝 يار /:3 'Jun-厚朴去枳實各半甘草

火之四車全書 图 犀角丸都除三焦邪熱球一切風氣治風盛痰實頭目 **各重肢節拘急痰涎壅滯腸胃燥澀大小便難** 口眼瞤動神思恍惚痰涎壅滯昏愦健忘虚煩少睡 九荆芥湯化服茶 酒嚼下亦得無時 右為末煉蜜為九每兩作十九以朱砂為衣每服 黃連觜犀角跨各人參士薩二大黃八十黑牽 啊 防風洗川芎 天麻是一宿甘草云两朱砂研 燈治準絕 圭

重 排風湯和治男婦風虚冷濕邪氣入藏狂言妄語精神 不能行步飲食失味夢寐倒錯與七人相隨肺風發 而熟悲傷瞋怒目張呼唤牌風發則面黃身體不仁 錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳 右與牽牛粉合和為細末煉蜜丸梧子大每服十五 不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧心風發則面亦翕然 九至二十九臨即温湯下更量虚實加減 槁 百二十雨炒别 粉六

こうしこに 手足不隨腰痛難以俯仰痺冷骨疼若有此候令人 右為麤末每服三錢水一盞半薑四片煎八分去 滓 目通藏府諸風疾 心驚志意不定恍忽多忘服此湯安心定志聰耳明 則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑 白鮮皮 當歸酒沒人桂去 苔藥者杏仁去 節 茯苓三两 妙甘草炒防風 隆治华甸 芍藭 白木的一獨活 卖 麻黄 努皮

欽定匹库全書 八風散剖治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼或皮 去浑食後温服臘茶清調一大錢亦得小兒虚風乳 香臘茶清調下半錢更量兒大小加減服 右為細末每服二錢水一盞入薄荷少許煎至七分 膚風瘡痒痛乃治寒壅不調鼻塞聲重 温服不拘時 藿香去土白正 前胡士產各黃蓍五甘草《人 參去 塩各羌活 法防風去蘆各

欠己の草を書 骨碎補丸利治肝腎風虚上攻下在筋脈拘擊骨節疼 右為細末酒煮麪糊為九如梧子大每服五九至七 掮 九温酒下婦人酷湯或當歸酒下妊娠不宜服 利行復艱難 荆芥穗 樂錢半自然銅酯洋鳥頭炮去半夏湯洗七 骨碎補去毛威靈仙苗縮砂仁而 地龍去土 頭面浮腫手臂少力腰背强痛脚膝緩弱屈伸不 1 白附子此件膝相以從答相沒一 發治準絕 圭 次 没 袹

大三五七散剂治八風五埤癱填驒曳口眼鳴斜眉角 烏荆九見下 等疾 蟲行又治陽虚頭痛風寒入腦目旋運轉如舟船之 發熱骨節煩疼肌肉麻木腰膝不仁皮膚瞤動或 上耳內蟬鳴或如風雨之聲應風寒濕痺脚氣緩弱 牵引项背拘强牙關緊急心中愦悶神色如醉遍身 山茱萸 乾薑地茯苓三片 細辛 卷十九 八两防風 如

久己日華全書 题 四生散和治男婦肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明 瘡以豬腰批開入藥二錢合定紙裹煨熟,空心細 右為細末每服二錢薄荷酒調下如腎藏風下疰生 覺兩耳中痒 多淚下疰脚膝生瘡及遍身風癬服藥不驗居常多 右為細末温酒調下二錢食前服 黄蓍 附子地去皮割 川羌活 發治準絕 英泰沙苑白附子生用 兲 嚼

鱼気にん 省風湯和治卒急中風口噤全不能言口眼喝斜筋 不定神志昏愦一切風證可預服之 右㕮咀每服四大錢水二大盞薑十片煎一中盏去 煩滿左癱右與手足麻痺骨節煩疼步復艱辛恍忽 孽急抽捧疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈 以鹽酒送下 草土两各 防風 13 700 南星四两 半夏白好者水黄芩去產 脈 廿

火之四車全書 輕脚九 四生丸部治左癱右處口眼喎斜中風涎急半身不遂 無效 右為細末用無灰酒打麪糊為九如桐子大每服七 九漸加至十五九温酒下服此藥莫服靈寶丹恐藥 不能舉者悉皆療之 浑温服無時 五雪胎去骨碎補 治左癱右疾脚弱不能行履 姓治华紀 川鳥頭去及當歸分等 竞

伏虎丹刺專治左雞右疾 忌熟物少時 酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服病在下空心服 右末之亦豆糊為九如梧子大每七九加至十九温 半兩踯躅花炒南星 白膠香 草烏地各 生轧地黄 蔓荆子 小豆為末打糊 木體子研白膠香研白芍藥 各二草鳥去及火赤 白殭蠶以去終各五靈情

换 皆泰之 腿九部治野經虚弱下注腰膝或當風取涼冷氣所 忽不见已而病除道人至投此方藥 吟難忍氣滿喘促舉動艱難面色黧黑傳送秘澀並 末之酒煮半夏末為糊九如龍眼大每一九分四 痛有妨侵地大治乾濕脚氣亦腫痛楚發作無時呻 乘沉重少力移步遲緩筋脈擊痛不能屈伸脚心隱 酒吞下日進二服 1.1. 乃服道此 隆治华起 知之仙道 国建酒康 思風百治無以水鳥衣巷 有老 す 7 服 有好

銀定四库全書 經園和治左雞右與手足頭掉言語審澀渾身疼痛 脚氣之患時有人患此疾服 心温酒或木瓜湯下日二三服常服舒筋輕足永無 右為細末麪糊九梧子大每服三十九至五十九空 兩乾木瓜 **笼雷歸盖天麻齿附子皮暗羌活** 根草解後黃蓍多續斷各一為木米泔浸去華解做 石楠葉 南星 腿之之一 製炒川牛膝 防風火去 焙酒 浸 肉 桂 椰 石

久足四車全 木瓜九 拍時 約 右為末醋糊為丸如梧子大每服三十九温酒下不 氣壯骨輕身 及跌撲閃肭外傷內損常服通經絡活血脈球風 生黑豆 皮 脈拘攣不得屈伸項背强直下疰脚膝行履艱難 兩乳香 劑和 治腎經虚弱下攻腰膝沉重少力腿脚 煮 候斤 雨研 且以 没藥 脹 澄治準絕 為度去之益二十一 半 半两草鳥地 D 取枚 豆去 兩 四焙頭 轧足 同 7 11] 鳥 腫 痒 順 炮

右為細末酒糊為九如桐子大空心木瓜湯吞三十 在破生瘡脚心癮痛筋脈拘擊或腰膝緩弱步復艱 難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無 五九温酒亦得 久新並宜服之 熟地黄焙陳皮去烏藥各四 牛膝酒沒各赤芍藥一 杏仁头、當歸 旋落酒浸 乾木瓜 黑牵牛以而石楠藤 續斷

久七四年全替 一 犀角防風湯統治 黄錢 水二鍾薑五片煎 謇澀四肢麻木 ボ 連翹 石五分石膏分麻黄 犀角磨水臨防風 細辛分 當歸 各四 黄芩 切諸風口眼喎斜手足雜拽語言 鐘稍熱服取汗大便秘結加 發治準絕 甘草炙天麻 全蝎炒海荷 獨活 山栀谷五荆芥 羌活分 沿 桔梗 罕

一多以口 追風如聖散的治男婦諸般風證左癱右癡半身不遂 金刃所傷血出不止數之立止 偏止頭風無問新舊及破傷風角弓及張蛇大咬傷 遍身瘡癬上攻頭目耳內蟬鳴痰涎不利皮膚搔痒 口眼歪斜腰膝疼痛手足頑麻語言審澀行步艱難 芷 川鳥 人と言 何首烏 全蝎 草烏 天麻 蒼木西 金針石斛而川芎 細辛 藁本終五甘草兩人參與兩 當歸 防風 麻黄 荆 白

久二司臣上野 蠲風飲子與治中風癱疾口眼唱斜及一切手足亦注 疼痛肢節擊急麻痺不仁 右為細末每服半錢七臨卧茶清下温酒亦可不許 多飲酒服後是一切熟物飲食一時恐動藥力 川芎 頭尖 何首鳥 防風盖杜仲盖治炒羌活 白芍藥 革解 验治準絕 蒼木米 祖没白木 生地黄溪川牛膝去蘆秦艽 白芷 川當歸去蘆 木遁 置 酒 洗

多另四周白書 右各切細用無灰好酒二斗五升以磁確感酒浸藥 皮紙十数重封口冬半月夏七日秋春十日每清晨 她猪牙皂角終半两頭尖臍 釣藤各半海桂去 荆芥穗 楓子內威靈仙 次赤茯苓及橘红 薊 理省藤 海桐皮去魔五加皮 血藤即 桑絡藤各一生薑梅 魔草鳥去及甘草節 杂寄生 陰地蘇地茶大薊 防巳 天麻 南星製半夏 丁公藤 殭麵 川鳥 炒 兩各 去

文二日日 Lat 稀養九濟治中風口眼唱斜時吐涎沫語言蹇澀手足 緩弱 右五月五日六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九 曝每蒸用酒蜜酒之蒸一飯頃日乾為末煉蜜丸桐 切動氣發風之物 禽鰕蟹等肉味及煎,博油膩水菓生冷花麥熟麪一 午前午後臨卧各服一大白盞忌難猪魚羊驢馬飛 稀黃草根問帶指答氣者是 姓治草絕 出

多英四個白雪 極濟換骨丹成治半身不遂口眼唱斜手足不仁言語 謇 方每稀簽一斤加四物料各申川烏 子大每服百九空心温酒米飲任下 精神昏澀行步艱難筋脈拘急左癱右痪 槐菜 澀或骨痛連髓或痺襲皮膚或中急風涎潮不言 蔓荆子 人参 威靈仙 桑白皮 防風船二五味子 蒼术 白芷 錢羌活防風 切風疾 何首鳥 苦參

久と日奉を寄 一人 自汗服之是重亡津液也若風盛之人當於密室温 驗再服須更隔五日服之如中風無汗宜服若體虚 自晨浸至晚食後臨卧攪匀服之神清無睡是藥之 每一兩作十九朱砂為衣每服一九先搗碎酒一盞 升半入銀石器内熬成膏入前藥和勻杵三五千下 根節天河水三石三斗熬至六斗濾去浑再煎至二 右一十四味為細末入麝香令勻又用麻黄十斤去 香附 川芎兩二 经治準絕 麝香與龍腦二後另研 弘

金牙四人 搜風順氣九惠治三十六種風七十二般氣去上熱下 冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食漸漸羸瘦顏色不 卧取汗 完黃亦惡瘡下在口苦無味憎寒毛聳節年殿群氣 **球風順氣** 利變成勞疾百節疾疼小兒老人皆可服補精駐 塊丈夫陽事斷絕女子久無子嗣久患寒瘧吐逆瀉 車前子上兩白檳榔 卷十九 火麻子殼另研 郁李仁湯 頹

火之四車全書 一 之除根如顫語審澀及癱瘓服之隨即平復酒後 藥覺藏府微動以羊肚肺羹補之久患腸風便血 聰明六月腰脚輕健一年百病皆除老者返少如服 腸内宿滯三月無倦少睡四月精神强勝五月耳 百無所忌早長臨卧各一服服經一月消食二月去 右為末煉蜜丸桐子大每服二十九酒茶米飲任下 匙炒防風义獨活的去 防風去獨活各 研 免絲子酒浸焙牛膝酒沒此山藥各三枳殼 谁治华絕 錦紋大黃五錢半 四十六 服 目

史國公浸酒方 愈風丹 多ジャ 右為末煉蜜丸桐子大用白湯下五七十九 不隨等證 服 天麻 宿醒消盡百病不生孕婦勿服 兩 兩 ٤ ļ 四 ノンテー 熟地黄 當歸 治足三陰虧損風邪所傷致肢體麻木手足 牛膝酒沒草解 骨節酸疼諸般寒濕專治左癱右與四肢 生地黄作 主參而 杜仲 風頑 氣麻 獨活兩肉桂 两羌活

火足可車全等 藥滓晒乾為末米糊丸梧子大空心酒下五十九 忌 用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封十日取飲時不 食發風動氣之物 可面向譚口恐樂氣街人頭面飲酒不可問斷飲盡 中寒 當歸 防風去蘆春艽 枸杞子兩克茄根 虎脛骨箔段一日 活 整治华规 川牛膝 八兩飯 上蒸热 松節 鼈甲云草解 晚蠶砂 里 μĐ

多少正人分言 蘇合香丸見平 五積散利治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐 或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷 不調或難產並治 外感風寒及寒濕客于經絡腰脚痠疼及婦人經血 肉桂 白芷 桔梗云蓝十 芍藥 茯苓 兩 积殼去縣麻黃本節陳皮去 半夏七次當歸 庭皮 乾薑兩些倉木 川芎 甘草 炙

えこりる いか 蓋附湯明治中寒口噤四肢强直失音不語忽然暈 傷寒大便自利而發熱者 加艾酯 口吐涎沫狀如暗風手足厥冷或復煩燥兼治陰證 右㕮咀每服四錢水一盞薑三片蔥白三根煎七分 乾薑 服冒寒用煨薑挾氣則加茱萸婦人調經惟產則 兩 熟附子分 各四 整治準紀 哭人 倒

多次四月五章 白通湯內加白术倍之甘草減半名生附子白术湯 脈者更宜審之兼治中脫虚寒久積痰水心腹冷痛 煩燥夜則安静不嘔不渴六脈沉伏並宜服此不知 治傷寒經下後又複發汗內外俱虛身無大熟畫則 右攻咀每服四錢水一盏半煎至七分去洋温服或 治中風濕昏悶恍惚腹脹滿身重手足瘿疲漐漐自 霍亂轉筋四肢厥逆 慮此樂性大燥即以附子理中湯相繼服餌薑附本 方附子湯以生用者名曰

久二日日 A Man 1 不換金正氣散和治四時傷寒温疫時氣頭疼肚熱腰 附子理中湯 水二種煎八分食前温服 急不能轉動更宜審而用之 弱腰脊强急口眼喎噼語聲渾濁胸腹順脹氣上喘 **术人參甘草等分名附子麻黄湯治中寒濕昏暈緩** 汗失者不語便利不禁 乾薑 焰木 人參 经治华紀 甘草矣各二附子绝二 一方用薑附湯加麻黄白 乳

多牙巴石石量 來復丹創治上盛下虚裏寒外熱伏暑泄瀉如水 右作 土尤宜服之 **浑食前稍热服忌生冷油腻毒物若出遠方不服 背拘急山嵐瘴氣寒熟往來霍亂吐瀉藏府虚寒下** 痢赤白 錢炙 蒼木製桶皮出半夏麴,厚朴薑藿香路二 服水二鐘生薑五片紅棗二枚煎至一鐘去 甘草 水

部暑散 次 之四車全書 蘇合香丸 飲下 末拌匀好醋打糊為九豌豆大每服三十九空心米 右用五靈脂二橘皮為末次入玄精石末及前二氣 硝 乾青皮去陳皮去 末氣 石色機不可火力 效得 太陰玄精石飛船上硫黃透明者五靈脂 見卒 發治斗絕 兩白 大為 遇恐傷藥 各 力内 再以 研微 極火 至 細妙 名用 沙澄

香薷飲都治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之 拘時服 右吹咀每服三錢水一盡入酒少許煎七分沉冷不 常散如有搐搦加羌活煎服 右為細末每服二錢不拘時新汲水或白湯調 方又加黄連四兩用薑汁同炒令黄色名黃連香 香薷去上白扁豆做炒厚朴去皮薑汁 赤茯苓是甘草生各寒食麪 生薑各 服

欠己日華公書 香薷湯和 大順散和治昌暑伏熟引飲過多脾胃受濕水穀不分 右先将甘草用白砂炒及八分黄熟次入乾薑 同炒 霍亂嘔吐藏府不調 右為細末每服二錢不拘時沸湯點服鹽點亦得 甘草当十年乾薑 杏仁去皮肉桂去煮及 炙半 白扁豆炒茯神 兩 避治草絕 厚朴去養及對蓋香萬二甘草 至

多岁四人 四里 桃 眩 把葉散和治中暑伏熱煩渴引飲嘔熾惡心頭目昏 予ロ 净後入桂一處搗羅每服二錢水一鍾煎七分温服 今薑裂次入杏仁同炒今杏仁不作聲為度用篩 煩燥并花水調服不拘時以沸湯點服亦得 七錢 兩 桃 麥門冬山白茅根 把禁去平陳皮湯浸去丁香 乾木瓜 厚朴去皮 甘草人兩 香薷 各逢 半薑

とこの年上上 星香散風中 氣丹海治伏暑傷冷二氣交錯中院痞結或瀉或嘔 服 以下可服半錢更量大小加減 右捣羅為末每服二錢水一盞生薑三片煎七分温 如桐子大每服四十九不拘時新井水送下 右為末於銀石器內火炒今黄色再研用糯米糊九 硝石 温湯調服亦得如煩燥用井花水調下小兒三歲 硫黄分等 姓治华組 至

多英四周百言 生 補中益氣湯見勞 蒼水白虎湯見傷 縮 脈散縣治熱傷元氣肢體倦怠氣短賴言口乾作渴 胖飲和消暑氣除頭渴 欲温任意服代熟水飲之極妙 右服四錢水一碗煎八分水沉冷服以解煩或欲熱 縮砂仁 白扁豆去皮炒 倦 烏梅內洋草菜提去甘草各四克乾為出

久己日年上島 大黄龍九一治中暑身熟頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐 汗出不止或濕熱大行金為火制絕寒水生化之源 昏悶不食 右水煎服 致肢體痿軟脚敬眼黑最宜服之 人參錢五味子 白麪 船上硫黄 硝石兩 白礬 麥門冬錢三 验治华紀 雄黄 滑石两半 <u></u>

多月でた 除濕湯一治寒濕所傷身體重著腰脚酸疼大便溶泄 地 榆散成治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢 若血痢水煎服 右五味研末入麪和与滴水丸如梧子大每服三十 右為末每服三錢漿水調服如無只以新汲水亦得 **九新井水下管見云有中暍昏死灌之立甦** 中濕 Male Li 赤芍藥 黄連着青皮去白各

久足四草全 白术酒写治中濕骨節疼痛 前温服 酒以水代之 右用白术一兩酒三盏煎一盏不拘時頻服不能飲 右㕮咀每服四錢水一盏薑七片棗一枚煎七分食 小便或澀或利 白茯苓士及各甘草炙之白木生用 半夏麵炒厚朴整蒼太各二兩電香葉 陳皮 發治半絕 香

多りとい 木香調氣散刺治氣滞胸膈虚痞惡心宿冷不消心腹 蘇合香丸見卒 味順氣散濟凡中風人先服此樂順氣次進治風樂 刺痛 右為細末每服三錢水一盞煎七分温服 烏藥 白术 中氣 <u>Ji</u> /1) Table 白茯苓 人参各一是甘草和 青皮去香白芷 陳皮孟天台

文正日東全書 四七湯泉 加減平胃散東治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿 藿香正氣散風中 和丹即養正丹黑錫丹來復丹 右為細末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時點服 中食 炙甘草南 縮砂仁兩 白荳蔻仁 丁香 隆治準紀 檀香 木香兩一藿香葉 星香散風中 八味順氣散見中 圭

捻沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲碎 七分去滓温服或去薑棗帶熱服空心食前入鹽一 右為細末每服二錢水一盞薑三片棗二枚同煎至 霍亂及五噎八噫隔氣皮胃等證 刺痛口舌無味胸滿短氣嘔喊惡心噫氣吞酸面色 **痿黄肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發** 厚朴去魔皮蓋製倉术去魔皮米陳皮三斤二 判炒三 廿

月とり

とこつこと 弦 參黃著 心下痞問腹脹者加厚朴甘草減半 痰涎加半夏陳皮 凡加時除蒼术厚朴依例加之 夏加炒黄芩 遇雨水濕潤時加茯苓澤寫 風寒冷濕四時非常之氣 心下痞氣加积殼木香 澤瀉 米穀不化飲食傷多加枳實 細加歸身黃蓍 脈洪大緩加黃芩黃連 服五錢有痰用半夏一兩 弘治率起 胖胃困弱不思飲食加人 如小便赤澀加白茯苓 咳嗽飲食減少脈 胃中氣不快 卖 女口 有 遇 便

多定匹 海藏加減平胃散例 脚手心熱煩燥不安百節痠疼加柴胡 若温疫時氣二毒傷寒頭痛肚熟加連鬚怒白五寸 為調胃散一法加藿香半夏 硬加大黄三錢芒硝二錢先嚼麸炒桃仁爛以藥送 豆政三十粒煎二三沸取微汗出愈 痢加薑製半夏 若小腸氣痛加茴香 库全書 卷十九. 若泄鴻牌濕加茯苓丁香白术 加乾薑為厚朴湯 若五勞七傷 若水氣腫 若痰嗽瘧

冷月事不調者加桂枝 牛膝 極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿膝痿弱婦人官藏久 豆蔻 頭風加豪本 若轉筋霍亂加樟木皮 若七邪六 加兔絲子 若白痢如具茱萸 赤痢如黄連 满加桑白皮 加丁香 若飲冷傷加高良薑 若滑脫泄瀉加肉 若渾身虚腫拘急加地骨皮 若風痰四肢沉困加荆芥 若婦人亦白帶下加黄著 若酒傷 若問塞嘔吐多加生薑 若腿膝冷霜加 **岩腿膝濕痺** 岩

久足四草全書 西

姓治华紀

Ž

金りがじ 氣痛者加苦棟懷香 不换金正氣散 冬月加呉茱萸川椒乾薑桂為呉茱萸湯 若加豪 金飲子 砂仁香附三兩生邁煎服 法加茯苓丁香各三兩 本桔梗為和解散治傷寒吐利 異功散相合為調胃散 若與六一散相合為黃白散 若握疾寒熱者加柴胡 老十九 若飲食進退加神妙麥芽 若氣不舒快中院痞塞加 若與五苓散相半為對 若加霍香半夏為 若與錢氏 若小 腸

火との車を 白虎加蒼术湯 調氣平胃散 蘇合香丸見卒 前方内去人参加蒼木一增水作四服 水二鐘生薑三片煎八分食前服傷暑 香一致蒼木中發厚朴遊汁陳皮各一甘草五 中惡 木香 烏藥 白豆蔻仁 整治草絕 檀香 砂仁錢一 爻

金だないん 香薷飲 六和湯產治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒熱交作 水二鍾薑五片紅棗一枚煎一 畏食 傷寒陰陽不分冒暑伏熟煩悶或成痢疾中酒煩渴 瓜 草五分赤茯苓皮藿香土白扁豆墨沙厚朴薑木 香薷錢縮砂仁 半夏为洗杏仁头人多蓝 **錢各** 一 7.1 Just 香薷湯俱見 鍾不拘時服 甘

見三日事会島 桃 五苓散 消暑丸都治伏暑引飲脾胃不利 把葉散 右為末薑汁煮糊丸無見生水如桐子大每服五 **冯** 若利 不拘時熱湯送下 半夏一斤用醋甘草吐茯苓五皮 渴見 痰小飲便 消 停節並用生薑雖飲水多亦不 **经治**準超 热中頭者 來復丹 痛為 湯下入 夏之後 不 可為 害應 是暑樂皆 不 服患 去皮各 之樂 尤 下 妙即 甦 更 秃 月傷 缺及服發

霍香正氣散見中 重りし 胃苓飲即平胃散五 春澤湯人多 酒煮黄連丸都治伏暑發熱嘔吐惡心並治隔熱 一胃散 毒厚腸胃 黄連二两 好酒 人参一錢即五苓散)俱見 見中 中暑 食 カロ 斤五 縮脾飲暑 理中湯見霍 蘇合香丸見辛 辰砂五苓散 等分柱減三之 小半夏茯苓湯則 見中 痰

夕この臣と野 益元散即天水散 末少許名雞蘇散加青黛末少許名若玉散治療並 催生下乳神效 服三五十九空心熟水送下 右為極細末每服三錢白湯調下新水亦得加薄荷 不通及霍亂吐瀉下利肠避偏主石淋及婦人産難 右將黃連以酒煮乾研為末滴水丸如梧桐子大每 桂府滑石月 膝白者粉草研糊 治傷寒表裏俱熱煩渴口乾小便 **姓治华**绳 卒

三黄丸 多写四月石量 四君子湯芳屋 味香薷飲一消暑氣和脾胃 同但以迴避世俗之輕侮耳 右為細末每服二錢不拘時熱湯或冷水調下 香薷一人參差陳皮湯此白术 豆然 黃蓍盖乾木瓜 热見發 星香散風中 養胃湯鬼 厚朴蜜汁製及甘草 白茯苓 白扁

消風散星眩 清暑益氣湯 白虎湯 三黄石膏湯 右水煎服 黄蓍一錢半汗蒼木 黄連美黄葉 分 石膏銭甘草か 山梔 登台华冠 一強升麻幾人 調胃承氣湯發熟 一陳湯見痰 玄參錢一 黄芩 知母 蓝白术

銀定四庫全書 黄耆人參湯 時斟酌 水二大盏煎至一盏去浑食遠稍熱服劑之多少臨 蘇酒麵炒各升麻公五味子丸 黄耆 我福皮不去甘草《當歸身流麥門冬士心各 陳皮 神麴 青皮私當歸身 麥門冬去心各五味子丸 多者加一錢 人參盧白本分 蒼木半一錢如自汗過人參去白本各五蒼木半 澤寫分 甘草 黄葉浸萬根

2.10 ml line 少夢寐問困之無力加五味子丸 分葉本分細年分川芎分生地黄分 連分川号分 脇下痛或縮急加柴胡二三 濕麪大料物之類及過食冷物 水二盏煎至一盏去滓稍熟食遠或空心服之忌酒 一日不見者致食少食不下血中伏火而不得潤也 胃院當心痛減大寒藥加草豆蔻仁分 頭目不清利下壅上熱加蔓荆子 從治準絕 頭痛目中溜火加黄 如心下痞悶加黄 大便澀滯隔 如氣短精神 李二

鱼好口 勿 其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當寫之 以 復加止常服黄蓍人參湯八用羌活兩防風平 不 如大便通行所加之藥勿再服 加當歸身生地黄分 服 水四盏煎至一盏去浑空心服之大便必大走也 通也是熟則生風其病人必顯風證單血樂不 用别藥少加大黃獎 如又不利非血結血 Ľ 便止 白重 胸中氣滯如青皮并去白陳皮倍之去 分 桃仁尖为研 麻子仁各五桃仁三粒去皮麻子仁 如大便又不快 松 利 可 而

てこり 日 人」 かっ 参益氣湯見者 味子 同煎服 更加本香三分 砂仁三分 白豆蔻仁分與正藥 **魚滯太甚或補藥太過或人心下有憂** 黄蓍 粒白茯苓 黄連 教育本 腹痛不惡寒者加ち 隆治草絕 升麻分二當歸一分 白木路 陳皮五味 一發澤德 至三

潑火散 水药蘆丸 多月四儿 昏迷欲死者 即中暑門地榆散 每服半雨水二盏煎一盏去滓稍熟空心服 川百藥煎馬人參獎麥門冬 分柴胡 禁酒甘草人分 乾薑 Tut. Lit 治傷暑煩燥口苦舌乾頭痛惡心不思飲食 治胃暑毒解煩渴 甘草两 麥門冬 生地黄 烏梅肉 神麵 省答 白梅肉 黄

2 TUD HOL Le Ains 香薷丸剂治大人小兄傷暑伏熱燥渴瞀問頭目昏眩 右為細末煉邃和凡每兩作三十九每服一九至二 或發霍別吐利轉筋 胸膈煩滿嘔噦惡心口苦古乾肢體困倦不思飲食 月出行可度一日 右為細末麪糊為丸如雞頭實大倉化每服一九夏 錢 甘草色 檀香到丁香各二 香薷士根紫蘇去笼乾木瓜 藿香洗去花神 经治单超 盆

多好四月日書 野者湯二治野虚傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便 除濕湯 自利 每服四錢水 凡細嚼温湯下 乾薑 校苓雨 見中 傷濕 温 制治寒濕所傷身體重著如坐水中小便亦溫和 盛煎七分空心温服 各世草 干多白术 各二 婀

敗毒散 五苓散 温服 每服四錢水一盤一聚一枚薑三片煎七分食前去 10 % 1.1. 大便溏泄 蒼术 羌活 見消 丁香谷二 白术 獨活 前胡 隆治华龟 戊已丸海 柴胡 芎藭 枳殼 上两桶红 至

到定四库全書 桂枝湯量 處果濕脚弱此藥不可闕也日二三服以知為度煩 兒皆可服或瘴煙之地或瘟疫時行或人多風痰或 熟口乾加黄芩 痰頭疼目眩四肢痛增寒壯熱項强睛疼及老人小 温服或沸湯點亦得治傷寒温疫風濕風眩拘踡 右為細末每服二錢水一盞入生薑二片煎至七分 仲 桔梗 再各甘草 平 風

欠己日年上書 清熱滲濕湯 五積散 五瘫湯 病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑 時許遍身教教微似有汗者益住不可令如水流漓 升服已須史歌熟稀粥一升餘以助樂力温覆令 右㕮咀以水七升微火煮取三升去浑適寒温服 瘅 見中 寒 ち樂 生薑 發治草絕 青木香九魚 防已黄蓍湯 两 甘草人 大聚妆学 重 見身 李大

金岁日月八十 ,附湯 掮湯 味此藥暖肌補中助陽氣止自汗, 皮乾薑 大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食 水二種煎八分服 黄檗鹽水炒黄連 茯苓 **术各一甘草分** 體見 扇身 治風濕相将身體疼痛不能轉倒不嘔不渴 如單月滲濕去黃連黃檗如橋 澤鴻各一蒼木 见心 白

欠と日東全等 一 大補地黄丸 滋燥養柴湯 右水煎服 黄檗班 熟地黄四町 當歸洗山藥 當歸一我生地黄 黄芩五分 防風幾甘草五 三两女母炒州住口母鹽 傷燥 治精血枯涸燥熱 治皮膚皴揭筋燥爪乾 發治準絕 茶與肉 熟地黄 白芍藥品上生 白芍樂 秦艽 垄 枸杞

清涼飲子 錢二 用水二鍾煎至八分不拘時服 鹽湯送下 右為細末煉塞丸如桐子大每服七八十九空心淡 分 甘草 黄芩 五錢肉從落沒玄參五錢二兩內從落酒玄多 黄連終二海荷 左参 當歸 治上焦積熟口舌咽鼻乾燥 哬 大便秘結加大黄 ち樂

九二司臣 白馬 潤腸丸便不通 滞通幽湯 治大便燥澀 隆治草蝇 八正散鬼

證治準絕卷十九	_						多英四月白言
1.							卷
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>	 	<u>_</u>